

Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est et de la DRAAF

18 novembre 2026

BILAN ARBORICULTURE 2026

Cliquez sur le sommaire pour accéder directement au paragraphe

Bilan météorologique
- Les précipitations
- Les températures
- Le gel
- La grêle

Réseau d'épidémiosurveillance 2026

Réseau Pomme
- Phénologie
- Pression biotique
- Résultats des comptages bilan de récolte
- Bilan par bioagresseur

Réseau Poire
- Phénologie
- Pression biotique
- Bilan par bioagresseur

Réseau Prune
- Phénologie
- Pression biotique
- Bilan par bioagresseur

1 Bilan des précipitations

Le graphique présenté ci-dessous retrace l'évolution des précipitations pour le site d'Obernai entre janvier et octobre 2026.




Figure 1 : Graphique des précipitations de janvier à octobre 2026 pour le site d'Obernai (source données : VEREXAL)

2026 se caractérise par une année extrêmement sèche.
À Obernai, la somme de pluie entre janvier et septembre a été de **309 mm contre 609 mm en 2025, 752 mm en 2024 et 447 mm en 2023.** Le mois de février a été le plus pluvieux avec 85 mm de pluie. Le printemps et l'été ont été secs. Sur cette période, c'est le mois de mai qui a été le plus pluvieux avec moins de 60 mm. Entre mai et août, il est tombé 150 mm de pluie contre 220 mm en 2025 et près de 400 mm en 2024.

2 Bilan des températures

Le graphique présenté ci-après retrace l'évolution des températures pour le site d'Obernai entre janvier et octobre 2026.




Figure 2 : Graphique des températures de janvier à octobre 2026 pour le site d'Obernai (source données : VEREXAL)

L'année 2026 se caractérise globalement par une année très chaude.
À Obernai, la moyenne de températures entre janvier et octobre est **de 14,67°C contre 13,45°C en 2025** et 13,8°C en 2024.
Après un mois de janvier froid et février chaud, les mois de mars et avril ont été conformes aux années précédentes. À partir du mois de juin, les températures ont pris des proportions jamais atteintes. La moyenne des températures entre mai et août a été de 21,76°C contre 19,81°C en 2025 (19,35 en 2024). Le mois de septembre a encore été très chaud (18,45°C contre 15,37°C en 2025).

3 Le gel

Des températures négatives ont été enregistrées sur le réseau des stations météorologiques avec des valeurs comprises entre 0 et -3,9°C le 27 mars et entre -1 et -5°C le 28 mars.
Ces gelées ont pu avoir un impact sur les boutons floraux des pruniers, poiriers et cerisiers ainsi que sur les pêchers et les abricotiers au stade chute des pétales ou jeunes fruits.


4 La grêle

Un violent orage de grêle a eu lieu le 16 juillet sur une bande du secteur de Wissembourg occasionnant des dégâts importants dans les parcelles de fruitiers et de vigne.

Le réseau d'épidémiosurveillance en arboriculture en Alsace compte 4 partenaires :

- FREDON Grand-Est
- la Chambre d'Agriculture Alsace
- le Comptoir Agricole
- le VEREXAL.

Les observations sont effectuées de février à août sur un réseau de parcelles fixes (14 parcelles de pommier, 7 parcelles de poirier et 7 parcelles de prunier) et de parcelles complémentaires dites flottantes. Au total, cela fait 24 parcelles de pommier, 9 parcelles de poirier et 9 parcelles de mirabellier. Elles sont réparties sur 5 secteurs du territoire alsacien. Les secteurs de Brumath et du Sundgau sont suivis ponctuellement hors réseau. Les suivis de piégeage sont effectués par les partenaires et des producteurs.



Réseau fixe BSV Arboriculture Alsace 2026

Le réseau de surveillance Pomme est constitué de 24 parcelles réparties sur les secteurs de l'Outre-Forêt, Brumath, le Kochersberg, Traenheim-Westhoffen, Obernai et Colmar. Les observations ont été faites de manière hebdomadaire selon l'actualité des maladies et ravageurs.
Des notations bilans sont également effectuées en juillet et en septembre sur les principaux ravageurs afin d'évaluer plus précisément la pression des bioagresseurs selon le même protocole depuis 2009.

Le réseau de piégeage est constitué de 6 pièges pour le carpocapse des pommes et 1 piège pour la petite tordeuse des fruits, *Cydia lobarzewskii*.

La modélisation Tavelure avec Rimpro permet d'affiner l'analyse de risque sur les contaminations en temps réel en fonction des conditions météorologiques, en évaluant leur intensité et le suivi des stocks de spores.
La modélisation Carpocapse des pommes avec Rimpro permet d'affiner l'analyse de risque sur les différents stades du papillon et son intensité.
La modélisation concerne 22 stations météorologiques de producteurs réparties sur l'Alsace, du nord au sud : Steinseltz, Riedseltz, Schœnenbourg, Seebach, Rottelsheim, Kriegsheim, Duntzenheim, Neugartheim, Schnersheim, Furdenheim, Traenheim, Westhoffen, Balbronn, Bergbieten, Obernai, Stotzheim, Bergheim, Sigolsheim, Munwiller, Widensolen, Pfastatt et Tagsdorf.

1 Phénologie

Variétés	Date stade C (53)	Date stade F2 (65)
Natti	9 mars	13 avril
Fuji	9 mars	13 avril
Golden	23 mars	13 avril

Date des stades phénologiques C et F2 selon les variétés.

2 Pression biotique

Bioagresseurs	Fréquence	Intensité	Comparaison avec 2025
Puceron lanigère	1	1	<
Puceron cendré	3	1	=
Anthonome	1	1	<
Acariens rouges	0	0	=
Oïdium	1	2	>
Tavelure feuilles	1	1	<
Tavelure fruit	1	1	<
Carpocapse	3	2	>

Fréquence et intensité dans les parcelles : 0, 1, 2 ou 3

3 Les comptages bilan de récolte

Des observations ont été effectuées sur 46 parcelles de pommiers en septembre par les membres du réseau. Elles ont eu lieu sur les secteurs de l'Outre-Forêt, Brumath, Traenheim-Westhoffen, Kochersberg et Colmar.
Ces comptages concernent les maladies et les ravageurs suivants :

- puceron lanigère,
- acarien rouge,
- oïdium,
- tavelure sur feuilles et sur fruits,
- carpocapse des pommes.

Depuis 2009, ils permettent de fournir un bilan sanitaire et de comparer ce dernier avec les années précédentes.

	% des attaques	sept-24	sept-25	sept-26
arbres atteints	Puceron lanigère	2,4%	15,6%	1,6% ↘
	Acariens rouges	0,0%	0,0%	0,0% →
	Oïdium	6,8%	4,7%	9,6% ↗
	Tavelure feuilles	10,9%	24,8%	2,5% ↘
fruits atteints	Tavelure fruits	0,2%	2,5%	0,1% ↘
	Carpocapse	1,6%	0,9%	2,8% ↗

Tableau 1 : pourcentage moyen d'arbres ou de fruits atteints

	fréquence des parcelles touchées	sept-24	sept-25	sept-26
arbres atteints	Puceron lanigère	26,5%	36,4%	17,4% ↘
	Acariens rouges	0,0%	0,0%	0,0% →
	Oïdium	35,3%	36,4%	37,0% ↗
	Tavelure feuilles	23,5%	42,4%	10,9% ↘
fruits atteints	Tavelure fruits	14,7%	42,4%	10,9% ↘
	Carpocapse	67,6%	57,6%	65,2% ↗

Tableau 2 : fréquence des parcelles touchées

4 Bilan par bioagresseur

a. Carpocapse des pommes

Les données du réseau


Les pièges à phéromones ont été posés à partir du 13 avril. Les premières captures de carpocapse ont été observées le 20 avril à Niederentzen, le 28 avril à Dachstein, le 30 avril à Seebach et le 4 mai à Westhoffen et Neugartheim. Les captures se sont intensifiées sur le piège de Niederentzen le 28 avril et plutôt fin mai pour les autres pièges, donnant lieu à des pics de vol étalés. Le vol de la deuxième génération a eu lieu début juillet avec un pic de vol mi-juillet. Une 3ème génération a eu lieu entre mi-août et mi-septembre, peu suivie par piégeage.

Les premières larves isolées ont été observées en parcelle entre fin mai à Niederentzen et mi à fin juin pour les autres parcelles. Selon le modèle Rimpro, le pic d'éclosions a eu lieu de début à mi-juin. Les éclosions de la première génération se sont terminées de fin juin en secteur précoce (Obernai et Haut-Rhin) à début juillet pour les secteurs tardifs (Outre-Forêt, Brumath, Kochersberg, Westhoffen, Sundgau). L'intervol a duré 2 semaines. Le second vol a eu lieu au cours du mois de juillet. Avec la poursuite des conditions favorables, l'émergence d'un 3ème vol a été possible en Alsace. Concernant la dynamique du deuxième vol, l'intensité des captures a été hétérogène sur les pièges à phéromones. Elles ont souvent été de même niveau que la première génération voire supérieure (voir graphiques page 8 et 9).

Concernant les dégâts dans le réseau, 5 parcelles ont connu le dépassement de 2 % de dégâts, au-delà duquel la pression est considérée comme forte.


Un bilan intermédiaire a été publié en juillet dans le bulletin suivant : BSV n°23


Le graphique ci-dessous, issu du modèle Rimpro du poste d'Obernai, illustre la dynamique du vol de carpocapse de cette année.





Les intensités des deuxième et troisième vol ne sont pas caractéristiques sur la prévision par rapport aux observations en parcelle. La modélisation n'est pas indicatrice sur ce critère notamment en cas d'année hors norme qu'a été 2026. Les périodes de vol sont concordantes.


Les graphiques ci-dessous illustrent les captures des pièges à phéromones de Niederentzen, Neugartheim (zones confusées), Westhoffen, Dachstein et Seebach.






Carpocapse des pommes
Seebach - 2026
6
4
2
0
14/4
20/4
26/4
2/5
8/5
14/5
20/5
26/5
1/6
7/6
13/6
19/6
25/6
1/7
7/7
13/7
19/7
25/7
31/7
6/8
12/8
18/8
24/8
30/8
5/9
11/9
17/9


Carpocapse des pommes - Westhoffen - 2026
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
14/4
19/4
24/4
29/4
4/5
9/5
14/5
19/5
24/5
29/5
3/6
8/6
13/6
18/6
23/6
28/6
3/7
8/7
13/7
18/7
23/7
28/7
2/8
7/8
12/8
17/8
22/8
27/8


Carpocapse des pommes - Dachstein - 2026
25
20
15
10
5
0
14/4
19/4
24/4
29/4
4/5
9/5
14/5
19/5
24/5
29/5
3/6
8/6
13/6
18/6
23/6
28/6
3/7
8/7
13/7
18/7
23/7
28/7
2/8
7/8
12/8
17/8
22/8

Le bilan des comptages de septembre

Le résultat des comptages de récolte indique que le pourcentage moyen de fruits atteints est **au-dessus du seuil indicatif de risque de 2 % au-delà duquel la pression est considérée comme forte.** Il est de 2,8 % contre 0,9 % en 2025 et 1,6 % en 2024 (voir tableau 1 page 6). 65,2 % des parcelles sont concernées par la présence du carpocapse contre 57,6 % en 2025 (voir tableau 2 page 6). Le seuil des 2 % de dégâts est dépassé dans 34,8 % des parcelles observées contre 15,2 % en 2025.


Ces chiffres donnent une tendance de la pression du carpocapse qui peut être sous-estimée. En effet, au moment de la récolte, une partie des fruits piqués a déjà chuté ou a été éliminée lors de l'éclaircissage manuel.

Les dégâts de cette année sont très importants. Ils ont été fortement impactants sur la récolte sur certaines parcelles et représentent un fort inoculum de départ pour le printemps suivant. Les dégâts de fin de 1ère génération ont été de 0,3 % de fruits touchés selon nos comptages de juillet, ne présageant pas particulièrement une 2ème génération importante. Les conditions de températures élevées ont été favorables à la 2ème génération et ont engendré une 3ème génération avec des éclosions au cours du mois de septembre.

b. Petite tordeuse des fruits (*Cydia lobarzewskii*)

Le réseau continue de suivre un piège à phéromone dans le secteur à risque afin de maintenir un minimum de surveillance. En effet, les dégâts de cette tordeuse sont confondus avec ceux du carpocapse des pommes, rendant la gestion du ravageur compliquée.

Le piège a été posé à Dachstein mi-mai. Le graphique ci-après indique les captures jusqu'à mi-août. Une intensification des captures a eu lieu entre fin mai et début juin. Elles sont restées faibles jusqu'à la fin de la campagne. Des dégâts ont été signalés dans 2 parcelles du réseau au cours du mois de juillet entre 1 et 2 % de fruits touchés. Le suivi par piégeage a permis de cibler la période de risque, le ravageur est maîtrisé. Sa présence reste ciblée sur une zone restreinte.



c. Tavelure

Les données du réseau

La maturation des périthèces a été estimée entre le 9 et le 14 mars selon les secteurs. Le bilan des périodes à risque de contamination a été évalué avec le modèle Rimpro à partir de 16 stations météorologiques mises à disposition par des producteurs.

Les principales périodes à risque sont regroupées dans le tableau ci-dessous :

Dates	Nature des contaminations	Secteurs
16-17 mars	faibles	Rottelsheim
25 au 28 mars	faibles	Schoenenbourg, Steinseltz, Rottelsheim, Furdenheim, Neugartheim, Traenheim, Westhoffen, Obernai, Bergheim, Sigolsheim, Pfastatt, Munwiller, Tagsdorf
30 mars au 2 avril	faibles	Schoenenbourg, Steinseltz, Rottelsheim, Dutzenheim, Furdenheim, Neugartheim, Traenheim, Westhoffen, Pfastatt, Tagsdorf
	moyennes	Obernai
4-5 avril	faibles	Schoenenbourg, Steinseltz
10 au 15 avril	importantes	Duntzenheim
	extrêmes	Schoenenbourg, Steinseltz, Rottelsheim, Furdenheim, Neugartheim, Traenheim, Westhoffen, Obernai, Bergheim, Sigolsheim, Pfastatt, Munwiller, Tagsdorf
17 au 22 avril	faibles	Steinseltz
3 au 8 mai	extrêmes	Schoenenbourg, Steinseltz, Rottelsheim, Duntzenheim, Furdenheim, Neugartheim, Traenheim, Westhoffen, Obernai, Bergheim, Sigolsheim, Pfastatt, Munwiller, Tagsdorf
10 au 20 mai	moyennes	Obernai, Stotzheim, Bergheim, Sigolsheim, Munwiller
	importantes	Schoenenbourg,Steinseltz, Rottelsheim, Furdenheim, Neugartheim, Traenheim, Westhoffen, Widensolen, Pfastatt, Tagsdorf
	extrêmes	Duntzenheim
26-27 mai	faibles	Munwiller
31 mai au 5 juin	faibles	Schoenenbourg, Steinseltz, Rottelsheim, Furdenheim, Neugartheim, Traenheim, Westhoffen, Obernai, Bergheim, Sigolsheim, Widensolen, Pfastatt, Munwiller
	moyennes	Duntzenheim, Stotzheim, Tagsdorf
8 au 11 juin	faibles	Duntzenheim, Stotzheim

Principales périodes et intensité des contaminations de tavelure 2026 selon le modèle RIMPRO

Les contaminations ont débuté mi-mars avec des contaminations faibles, un mois plus tôt qu'en 2025. Il y a eu ensuite des contaminations extrêmes dès mi-avril. La modélisation a permis de définir des périodes de contaminations importantes à extrêmes entre la mi-avril et la fin mai, presque en continu. L'épisode du 3 au 8 mai est l'épisode majeur de la campagne 2026 avec des contaminations extrêmes encore plus élevées qu'en avril. Mi-juin, le stock d'ascospores ayant été projeté, les contaminations primaires se sont terminées.

A partir de fin-juin, le risque tavelure s'est arrêté pour les parcelles sans taches. Dans les parcelles avec des taches, les contaminations secondaires ont repiqué des foyers à chaque pluie ou rosée.
Concernant les dégâts en verger dans le réseau au cours de la saison, les premières taches sur feuilles ont été observées le 4 mai et celles sur fruit le 18 mai. Dans le réseau, 6 parcelles ont été concernées par la présence de tavelure.

Le bilan des comptages de septembre
D'après les comptages bilan de récolte (voir tableaux 1 et 2 page 6), la tavelure sur feuilles est en nette baisse avec 2,5 % d'arbres atteints contre 24,8 % en 2025. Le pourcentage de fruits touchés est en baisse et passe de 2,5 % en 2025 à 0,1 % en 2026. Idem pour la fréquence des parcelles touchées sur feuilles et sur fruit qui passe de 42,4% en 2025 contre 10,9% en 2026.
Malgré les 2 épisodes à fort risque de contamination en avril et mai, la sécheresse qui a suivi a freiné l'évolution de la tavelure.

d. Puceron lanigère

Les données du réseau
Les premiers foyers ont été signalés sur collet dans le réseau dès le 2 mars. Le puceron lanigère est présent dans 19 parcelles du réseau dont 4 pour lesquelles le seuil indicatif de risque de 10 % des pousses occupées a été franchi. Le parasitisme *Aphelinus mali* a été peu observé en été, les foyers de pucerons ayant été rares. Il a été signalé une fois début juillet dans le secteur de l'Outre-Forêt.

Le bilan des comptages de septembre
D'après les comptages bilan de récolte (voir tableaux 1 et 2 page 6), la présence des foyers de pucerons lanigères est en baisse cette année par rapport à 2025 (1,6 % contre 2,4 % en 2025). La fréquence des parcelles touchées est en baisse également avec 17,4 % contre 36,4 % en 2025.
Les conditions de sécheresse ont été peu favorables au puceron lanigère.

e. Acarien rouge

Les données du réseau
Dans les parcelles du réseau, aucun foyer d'acariens rouges n'a été signalé cette année.

Le bilan des comptages de septembre
D'après les comptages bilan de récolte (voir tableaux 1 et 2 page 6), aucun foyer d'acariens rouges n'a été observé à ce moment-là.
Cela fait 3 années que les acariens rouges restent rares en Alsace.

f. Oïdium

Les données du réseau
Dans le réseau, les premiers symptômes ont été observés vers le 9 mars. 9 parcelles ont été touchées par des pousses oïdiées. Elles avaient toutes un taux d'occupation inférieur à 10 %, sauf pour 1 parcelle avec un taux de 15 %.

Le bilan des comptages de septembre

D'après les comptages bilan de récolte (voir tableaux 1 et 2 page 6), le pourcentage d'arbres atteints est en hausse avec 9,6 % contre 4,7 % en 2025. La fréquence des parcelles touchées est similaire en passant de 36,4 % en 2025 à 37 % en 2026.

Les conditions météorologiques ont été peu favorables au champignon cette année avec les conditions sèches de l'été. Ce sont surtout les conditions humides de type rosée en août et en septembre qui ont fait apparaître des symptômes tardifs.

g. Puceron cendré

Les premiers individus ont été observés à partir du 9 mars dans le réseau. Les fondatrices ont été signalées entre les mois de mars et avril. Les foyers ont été visibles entre début mars et mi-juin. Les premiers individus ailés ont été signalés à partir du 15 juin. Le puceron cendré a été détecté dans 22 parcelles dépassant le seuil indicatif de risque dès sa présence. Ce sont principalement des petits foyers isolés qui ont été signalés pour 13 parcelles et des petits foyers réguliers sur 9 parcelles. Les foyers n'ont pas évolué rapidement et la migration s'est terminée fin juin. En l'absence de foyers de pucerons, les auxiliaires, comme les coccinelles, syrphes et chrysopes ont été peu présents.

h. Puceron vert

Les premières fondatrices ont été signalées au 30 mars. 21 parcelles ont été concernées par la présence du puceron vert dont 1 avec pourcentage égal au seuil indicatif de risque de 15 % signalé début avril. La majorité des autres parcelles n'ont pas dépassé les 10 % de pousses occupées pendant la campagne.

i. Anthonome


La présence d'anthonomes a été signalée dans 2 parcelles du réseau dans l'Outre-Forêt et dans le Kochersberg. Les captures d'adultes ont été faibles début mars, entre 4 et 11 individus sur un délais court de 15 jours. Les dégâts n'ont pas dépassé les 2 % de bouquets floraux attaqués. La pression a été plutôt faible cette année par rapport à l'an dernier. Les foyers restent toutefois localisés.

j. Mouche méditerranéenne des fruits (*Ceratitis capitata*)

Cette mouche n'a pas fait l'objet de suivi spécifique dans le réseau mais la problématique arrivée en Alsace en 2023 a toutefois incité la pose de pièges par les producteurs. Sur la période de juillet à octobre, les captures ont été très rares sur les 2 pièges situés à Sigolsheim et Obernai. Toutefois, des symptômes importants et caractéristiques ont été signalés sur deux parcelles dans les secteurs de Colmar et dans le Kochersberg, laissant présager le retour de la mouche.

k. Punaise diabolique (*Halyomorpha halys*)

Ce ravageur n'est pas suivi dans le cadre du réseau mais la problématique reste préoccupante. Le graphique ci-dessous représente les captures de larves (L1 à L5) et d'adultes dans le piège à Obernai. Les populations ont été très importantes cette année par rapport à l'an dernier. Il y a eu peu de dégâts signalés sur fruit.



(source : Projet LBA Halyomorpha halys, financement Région Grand Est, coordination FREDON Grand Est/VEREXAL)

l. Phytopte

Ce ravageur n'est pas suivi dans le cadre du réseau. Il a toujours causé des dégâts ponctuels et gérables mais depuis 2 ans, la présence des foyers augmente à l'inverse de l'acarien rouge. Cette année, 2 parcelles hors réseau ont été touchées par des dégâts non maîtrisés avec des impacts économiques.

Le réseau de surveillance est constitué de 9 parcelles réparties sur les secteurs de l'Outre-Forêt, le Kochersberg, Traenheim-Westhoffen, Obernai et Colmar.
Les observations ont été faites de manière hebdomadaire selon l'actualité des maladies et ravageurs.

1 Phénologie

Variétés	Date stade C (53)	Date stade F2 (65)
William	3 mars	7 avril

Date des stades phénologiques C et F2.

2 Pression biotique

Bioagresseur	Fréquence	Intensité	Comparaison avec 2025
Psylle	1	1	=
Tavelure	1	1	<

Fréquence et intensité dans les parcelles : 0, 1, 2 ou 3

3 Bilan par bioagresseur

a. Psylle

Les premières pontes ont été observées dans la semaine du 24 février avec une activité importante. Les éclosions ont ensuite eu lieu entre le 9 et 16 mars qui correspond ainsi à la première période à risque. Une seule parcelle a connu un taux d'occupation de jeunes larves supérieur à 10 % qui est le seuil indicatif de risque.
Une nouvelle génération d'adultes a été observée à partir de fin avril. Les éclosions ont eu lieu entre le 6 et 26 mai correspondant à la seconde période à risque sur les larves. 3 parcelles du réseau ont dépassé le seuil indicatif de risque atteignant entre 30 et 40 % de pousses occupées par des jeunes larves sur cette génération.
Une 3ème génération d'adultes a été observée entre mi-mai et fin mai avec la présence pontes. Toutefois, les éclosions n'ont pas été observées et le psylle s'est fait rare au mois de juin et juillet.

Le tableau ci-après synthétise les périodes à risque sur les jeunes larves de psylle :

09-mars	16-mars	6 au 26 mai	début juin
Jeunes larves		Jeunes larves	Fin du risque
faible présence		présence moyenne	

Périodes à risque Psylle

b. Tavelure

Les contaminations de tavelure sont identiques à celles de la pomme (voir le paragraphe Tavelure page 11). Dans le réseau, 1 parcelle a connu des symptômes de tavelure sur feuilles le 19 mai dans le secteur de l'Outre-Forêt. La tavelure sur poire reste anecdotique en Alsace sur les parcelles protégées.

Le réseau de surveillance est constitué de 9 parcelles de mirabelles et quetsches d'Alsace réparties sur les secteurs de l'Outre-Forêt, Traenheim-Westhoffen, Obernai et Colmar. Le suivi du carpocapse des prunes est relevé sur 4 pièges.

1 Phénologie

Variétés	Date stade C (53)	Date stade F2 (65)
Mirabelles	9 mars	26 mars
Questches d'Alsace	23 mars	9 avril

Dates des stades phénologiques C et F2 selon les variétés.

2 Pression biotique


Bioagresseurs	Fréquence	Intensité	Comparaison avec 2025
Carpocapse	1	1	>
Puceron vert	1	0	=
Acariens	0	0	<
Moniliose fleurs et rameaux	0	0	=
Coryneum	1	0	<
Tavelure	0	0	<


Fréquence et intensité dans les parcelles : 0, 1, 2 ou 3


3 Bilan par bioagresseur


a. Carpocapse des prunes

Le vol a commencé à la mi-avril lors de la sortie des pièges du réseau situés à Seebach, Westhoffen, Furdenheim et Niederentzen. Vous trouverez ci-dessous les graphiques des captures des 4 pièges.


Carpocapse des prunes - Niederentzen - 2026
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
14/4
20/4
26/4
2/5
8/5
14/5
20/5
26/5
1/6
7/6
13/6
19/6
25/6
1/7
7/7
13/7
19/7
25/7
31/7


Carpocapse des prunes - Westhoffen - 2026
400
350
300
250
200
150
100
50
0
14/4
19/4
24/4
29/4
4/5
9/5
14/5
19/5
24/5
29/5
3/6
8/6
13/6
18/6
23/6
28/6
3/7
8/7
13/7
18/7
23/7
28/7
2/8
7/8
12/8
17/8
22/8
27/8





Les premières captures ont débuté mi-avril. Un premier pic de vol a eu lieu entre fin avril et début mai environ. Le second pic de vol a eu lieu entre fin juin et début juillet. Une nouvelle intensification des captures a été signalée au cours du mois d'août détectant une 3ème génération.

Dans le réseau, les dégâts n'ont pas dépassé 5 % de fruits touchés. 6 parcelles ont connu des dégâts de carpocapse. Il n'y a pas de données de dégâts concernant la 3ème génération.

b. Puceron vert

Les premiers foyers ont été signalés autour du 7 avril. La présence du puceron a concerné 3 parcelles et le pourcentage de pousses occupées n'a dépassé 10 % que dans une seule parcelle, fortement touchée. Le puceron vert du prunier n'a pas eu les conditions pour se développer dans le temps. Les derniers foyers ont été signalés début mai. Les coccinelles, chrysopes et syrphes ont été peu présents par manque de nourriture en parcelle.

c. Acariens rouges

Les acariens rouges n'ont pas été signalés dans le réseau cette année malgré des conditions de températures favorables.

d. Moniliose fleurs et rameaux

La moniliose sur fleurs et rameaux n'a pas été signalée dans les parcelles du réseau. Les conditions relativement sèches au moment de la floraison n'ont pas été favorables aux contaminations.

e. Coryneum

Dans le réseau, 2 parcelles sont touchées par la présence de criblures sur plus de 50 % des feuilles et 2 ont des symptômes compris entre 5 et 50 % des feuilles. Les autres parcelles n'ont pas présenté de symptômes. Après les mois de mars et avril secs, les quelques précipitations de mai ont permis des contaminations. L'année globalement sèche n'a toutefois pas été favorable au développement du champignon, laissant une situation globalement maîtrisée.

f. Tavelure

Aucun symptôme de tavelure n'a été signalé dans le réseau. Il s'agit d'une problématique peu préoccupante en Alsace.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles.
S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles.

Observations : Chambre d'Agriculture d'Alsace, Comptoir Agricole, FREDON Grand Est, le VEREXAL, les Producteurs.

Rédaction : FREDON Grand Est.

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est.
Dans une démarche d'amélioration continue de qualité de la surveillance biologique du territoire, la DRAAF assure un contrôle de second niveau sur l'ensemble du processus d'élaboration des BSV.

Coordination et renseignements : Joliane BRAILLARD - joliane.braillard@grandest.chambagri.fr

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
OFB OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ
La stratégie écophyto 2030 Réduire et améliorer l'utilisation des phytos
CHAMBRE D'AGRICULTURE GRAND EST
FREDON GRAND EST